

RMN SENZA MEZZO DI CONTRASTO

Preparazione per lo studio:

- RM ADDOME SUPERIORE – COLANGIO: digiuno 6 ore.
- COLANGIO-RM: il Pz deve portare succo di mirtillo o ananas puro (400/500ml) da bere in struttura.
- RM PROSTATA: valore PSA + mini clistere di pulizia 6 ore prima dell'esame.
- PELVI FEMMINILE e RETTO: mini clistere di pulizia 6 ore prima dell'esame.
- PROSTATA E PELVI FEMMINILE: anche nello studio senza mdc e.v. per ottenere una migliore resa diagnostica sarà somministrata 1fl di Buscopan i.m. circa 10 minuti prima dell'esame.

AVVERTENZE:

- 1) Controindicazione assoluta all'esecuzione di esame RM riguarda i Pz:
 - * portatori di pace-maker che non possono eseguire esame RM (consultare il proprio Cardiologo per valutare eventuale possibilità di eseguire esame RM in ambiente ospedaliero).
 - * portatori di protesi valvolare meccanica.
- 2) Pazienti portatori di qualsiasi dispositivo (protesi valvolare biologica, loop recorder, espansori mammari, cateteri di derivazione ventricolo-peritoneali, ecc.) devono portare **documentazione scritta** per valutare la compatibilità con apparecchio di RMN "ad alto campo" (1.5T).
- 3) Pazienti portatori di schegge metalliche o altro materiale metallico corporeo (in qualsiasi sede) devono consultare il Personale di studio per valutare la compatibilità all'esecuzione dell'esame RM ad alto campo.
- 4) Pazienti sottoposti ad intervento di cataratta e angioplastica possono essere sottoposto ad esame RM ma è consigliabile dopo circa 2 mesi dall'intervento.

IMPORTANTE: È assolutamente importante e necessario portare documentazione completa sia clinica (visite, descrizione intervento ecc.) che iconografica (CD/DVD e referti di esami precedenti TC/RM/ecografia/PET ecc.) riguardante il distretto corporeo in esame e in generale la storia clinica del Pz.