

## TC CON MEZZO DI CONTRASTO

### Preparazione:

- Creatininemia e filtrato glomerulare (eGFR) eseguiti da non più di 3 mesi.
- Digiuno da 6 ore.
- È consigliabile eseguire lo studio dell'addome-pelvi con vescica a medio riempimento.

### In caso di allergie a farmaci effettuare la seguente preparazione antiallergica:

- 13 ore prima dell'esame 2 Cp di DELTACORTENE da 25 mg
- 7 ore prima dell'esame 2 Cp di DELTACORTENE da 25 mg
- 1 ora prima dell'esame 2 Cp di DELTACORTENE da 25 mg + 1 Cp antistaminico 10 mg + 1 compressa di gastroprotettore.

### Importante:

Per i Pazienti che assumono **METFORMINA** è necessario valutare il filtrato glomerulare (eGFR):

- eGFR >45ml/min: **non** è necessario sospendere la metformina.

- eGFR tra 30 e 45ml/min: sospendere il farmaco 48 ore prima dell'esame TC con mdc e riprenderlo 48 ore dopo previa verifica della stabilità renale.

- eGFR <30ml/min: la metformina è controindicata e l'uso del mezzo di contrasto è sconsigliato. Necessaria valutazione dello specialista.

**IMPORTANTE:** È assolutamente importante e necessario portare documentazione completa sia clinica (visite, descrizione intervento ecc.) che iconografica (CD/DVD e referti di esami precedenti TC/RM/ecografia/PET ecc.) riguardante il distretto corporeo in esame e in generale la storia clinica del Pz.

